

Second rapport du Comité régional d'homologation (CHR) de la LPO Haute-Normandie : 2009-2014

par Richard Lery (secrétaire du CHR)

Le premier rapport concernait la période 2003-2008. Les données présentées ci-dessous sont celles de la période 2009-2014, et les années précédentes pour les fiches parvenues tardivement. Ces données concernent les espèces homologables en 2014, certaines ayant été ajoutées ou retirées de la liste de ces espèces au fil de la période. Les espèces homologuées antérieurement et ne faisant plus partie de la liste des espèces homologables ne sont donc pas présentées ici, et peuvent être obtenues auprès de la LPO Normandie.

I. Modification de la liste des espèces à homologuer durant la période concernée

Globalement, les espèces à homologuer sont celles qui sont soit très rares, soit rares mais difficiles à identifier. L'actualisation de cette liste se fera désormais tous les cinq ans, en fonction de la fréquence des données présentes au fichier dans les dix années précédentes, et la fiche de relevé par site sera actualisée en tenant compte des modifications apportées à la liste des espèces à homologuer. Rappelons que les fiches de relevé par site permettent de noter toutes les espèces contactées lors d'une sortie de terrain, et sont destinées à enrichir la base de données ornithologiques de la LPO Normandie.

Nous avons créé il y a dix ans une fiche de relevé comprenant les espèces régulières en Haute-Normandie (216 espèces), la LPO étant alors uniquement haut-normande. Les espèces non présentes sur cette fiche étaient soit à homologuer par une fiche traitée en CHR pour les espèces d'origine sauvage, soit à inscrire directement sur une fiche d'observations ponctuelles pour les espèces introduites.

Ce choix de 216 espèces a été fait à dire d'expert, sans méthodologie scientifique. La réalisation de notre base de données régionale (sur l'ensemble de la Normandie) nous permet de penser aujourd'hui un choix rigoureux en fonction de la régularité d'apparition des espèces dans la base de données.

A partir de 2012, le critère retenu pour considérer une espèce comme régulière est celui de sa présence 5 années sur les 10 dernières années écoulées.

Sont donc pris en compte désormais, et ce depuis 2013, 232 taxons (229 espèces et 3 sous-espèces) qui satisfont à ce critère de présence 5 années sur 10. Ces espèces sont désormais incluses dans la fiche de relevé par site (depuis la version de 2013), sauf celles qui sont d'identification difficile, qui restent homologables : **Autour des palombes, Goéland pontique, Mésange boréale**. Enfin, les espèces suivantes ne sont plus à homologuer, en raison des critères ci-dessus mentionnés : Faisant vénéré, Bec-croisé des sapins, Bécassine sourde, Bruant des neiges, Cigogne noire, Gobemouche noir, Grue cendrée, Héron pourpré, Pie-grièche grise, Torcol fourmilier, Bihoreau gris, Grèbe jougris.

Les espèces homologables sont les espèces sauvages qui ne sont pas sur la fiche de relevé par site. Les espèces introduites qui ne sont pas sur la fiche sont à inscrire sur une fiche d'observations ponctuelles.

Concernant la Mésange boréale, l'argumentaire (validé lors de la réunion du CHR de début 2012) ayant justifié son ajout à la liste, est présenté ci-dessous.

« Au vu de la rareté des observations récentes et de la difficulté d'identification, les observations de la Mésange boréale feront désormais l'objet d'une fiche d'homologation. Pour être acceptées, les mentions devront faire état :

- *du cri typique de l'espèce (ké nasillard, traînant, appuyé et répété), que la Mésange nonnette ne produit pas.*
- *d'une observation visuelle permettant de confirmer qu'il s'agit bien d'une mésange « grise » et non de la Mésange charbonnière, qui peut imiter le cri de la Mésange boréale.*

Les deux critères devront être retenus, et non un seul. A noter que :

- *le cri typique de la Mésange nonnette (pitsiu suivi d'un ké répété, non traînant et non appuyé) est exclusif de la Mésange boréale, qui ne le fait jamais,*
- *le chant de la Mésange boréale (Mésange « des saules » en Normandie) n'est pas exclusif ; la Mésange nonnette peut le produire, il ressemble aussi à certains chants du Pouillot siffleur ou de la Sittelle torchepot,*
- *les caractères visuels de terrain (zone pâle sur l'aile, plus grande bavette, arrière du cou plus blanc, calotte noir mat) sont difficile à voir et peuvent prêter à confusion avec certaines mésanges nonnettes,*
- *l'habitat n'est pas déterminant,*
- *les quelques mentions récentes (depuis 2009) seront réévaluées en fonction de ces critères d'identification.*

Enfin, il a été décidé, lors de la réunion de début 2014, que les observations de hérons gardeboeufs seront validées sans examen par le CHR, compte tenu de l'augmentation récente des données de l'espèce dans la région, et de son identification aisée. L'espèce sera intégrée à la fiche de relevés lors de la prochaine version. Lors de la réunion de début 2015, il a été décidé de ne plus homologuer les bernaches nonnettes de Beauguillot, du fait de leur régularité, ainsi que les oies rieuses observées sur ce même site.

II. Quelques remarques utiles

- Réthoville et Vrasville sont deux communes voisines, « spots » ornithologiques appartenant partiellement au Conservatoire du littoral, et constitués de pelouses et d'un marais d'arrière dune, près de Gatteville, au nord-est du Cotentin.
- Gatteville, tout proche, correspond à la commune de Gatteville le phare, « spot » de guet à la mer (observation du passage des oiseaux en mer).
- Beauguillot est la réserve naturelle située à Sainte-Marie du Mont (Manche, marais de Carentan), et le polder contigu qui appartient au Conservatoire du Littoral.
- Les Ponts d'Ouve sont un site des marais de Carentan, aménagé pour l'observation des oiseaux, sur la commune de Saint-Côme du Mont (Manche).
- Sallenelles est la commune de l'estuaire de l'Orne (Calvados) situé au nord de Caen, site ornithologique de première importance pour nombre d'espèces.
- Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime) est la commune comportant d'une part le port pétrolier d'Antifer (d'accès restreint) avec sa digue s'avancant loin en mer, permettant l'observation des oiseaux passant en mer. Nous appelons généralement ce site « Antifer », par commodité. Le cap d'Antifer proche est sur la commune de La Poterie Cap d'Antifer.
- Courtils (Manche, baie du Mont Saint-Michel), est la commune comportant des prés salés, dont le lieu-dit appelé Rochetorin.

- La boucle de Poses (Eure), ou plus simplement « Poses », correspond aux anciennes (ou actuelles) carrières de sable ou de granulats devenues étangs, et aux communes de Poses, Tournedos sur Seine, ou encore Portejoie.
- L'appellation « Le Hode » correspond à la rive droite de l'estuaire de la Seine (Seine-Maritime).
- Les données homologuées par le Comité d'homologation national comportent dans cet article la mention HCHN.

III. Procédure d'envoi des données et de leur validation

Toute donnée à homologuer est à envoyer sur la boîte mail destinée à recueillir les fiches de relevé et autres données ponctuelles, et donc dorénavant les fiches de description d'oiseaux rares pour le CHR (fichesornitho_lponormandie@orange.fr).

Une fiche d'homologation type est disponible sur le site internet de la LPO Normandie, avec la mention de l'adresse électronique de la boîte « fichesornitho ».

IV. Liste des données homologuées par espèce (ordre alphabétique)

Pour le statut actuel des espèces en Normandie, se reporter à l'Inventaire des oiseaux de Normandie en ligne sur le site Internet de la LPO Normandie.

Alouette haussecol

2003 : 2 le 9 novembre à Réthoville

2005 : 10 le 9 janvier à Géfosse-Fontenay (baie des Veys) dans le Calvados.

2007 : 4 le 3 novembre à Réthoville

2008 : 5 le 1^{er} janvier à Portbail (Manche)

2010 : 8 le 24 décembre à Réthoville.

2011 : 4 le 27 février à Saint-Aubin-sur-mer (Seine-Maritime).

2012 : 1 le 7 février puis le 10 février, à Utah Beach (Sainte-Marie du mont, Manche).

2014 : 1 le 4 janvier à Saint-Germain sur Ay (Manche), 7 le 7 février à Cosqueville, nord-est du Cotentin (avec des bruants lapons), 4 le 19 janvier à la pointe d'Agon à Agon-Coutainville.

Autour des palombes

2003 : 1 mâle le 12 avril en forêt de Conches (commune de Conches-en-Ouche, Eure). 1 femelle le 19 mai toujours en forêt de Conches, mais sur la commune de Nagel-Séze-Mesnil, non loin de Conches. Pas plus d'élément permettant de penser qu'il s'agit d'un couple reproducteur, ce qui est néanmoins assez plausible.

2004 : 1 mâle le 25 avril en forêt de Conches, à Nagel-Séze-Mesnil, et 1 femelle le 18 mai, sur la même commune. Là aussi, on peut penser à un couple, mais sans certitude.

2007 : 1 le 26 février à Osmoy-Saint-Valéry, dans le pays de Bray (Seine-Maritime), trouvé mort.

1 le 22 avril à Sainte-Agathe-d'Alhiermont (pays de Bray, Seine-Maritime), sans suite semble-t-il.

2008 : 1 le 16 février, mâle adulte, à Bailleul-Neuville (pays de Bray, 76), en forêt du Hellet.

1 le 18 février à Saint-Pierre-Bénouville, dans le pays de Caux (76).

1 le 4 mars en forêt de Conches (27), femelle.

1 juvénile le 4 septembre à Isneauville (nord de Rouen).

2009 : 1 immature le 8 août à Maulévrier-Sainte-Gertrude (forêt du Trait-Maulévrier, Seine-Maritime).

2010 :

- En forêt de Roumare, à Sahurs (Seine-Maritime), un oiseau alarme le 28 mai, et deux jeunes sont vus le 23 juin.
- En forêt de Lyons, au Tronquay (Eure), une femelle adulte le 25 juin.
- En forêt de Brotonne (La Mailleraye-sur-Seine, Seine-Maritime), 1 adulte avec 3 jeunes au nid le 18 juin.
- En forêt du Trait-Maulévrier, à Maulévrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime), 1 adulte avec 2 juvéniles le 25 juin.

2011 :

- En forêt de Lyons (Eure), une femelle couve le 10 mai au Tronquay, et deux jeunes sont au nid le 4 juin. Le 25 juin, un jeune est hors du nid, et un autre est proche du nid.



Photo 1 : Autour des palombes, juin 2011, le Tronquay (27) - (Photo Triboulin L.)

- En forêt de Roumare, à Sahurs, le 3 avril, un couple alarme avec accouplements. Le 10 juin, le nid est abandonné et le cadavre d'un jeune est vu coincé dans les branchages.

2012 :

- En forêt de Lyons (Eure), un oiseau est vu en vol le 3 février, sans suite semble-t-il. Cette même année, à Bézancourt, à l'est de la forêt de Lyons, un nouveau site de nidification est détecté, avec deux jeunes au nid le 1^{er} juin et le 18 juin.
- En forêt de Brotonne (Seine-Maritime), à la Mailleraye-sur-Seine (site déjà connu), deux jeunes sont hors du nid le 23 juin. Dans un autre secteur, sur la commune de Vatteville la rue, des cris sont entendus le 1^{er} avril (site également antérieurement connu), avec deux jeunes hors du nid le 23 juin.
- En forêt du Trait-Maulévrier (commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude), une femelle est observée couvant sur son nid, le mâle alarmant tout près, le 25 mai, et 2 juvéniles sont observés le 29 juin dans leur nid.
- En forêt de Roumare, à Saint-Pierre-de-Manneville (Seine-Maritime), 4 juvéniles sont à l'aire le 17 juin ; et le 3 juillet deux jeunes sont encore au nid, et un autre est vu en vol. Un adulte a par ailleurs été vu le 9 juin à Hénouville, tout proche, probablement un des membres du couple de la forêt de Roumare.

2013 :

En forêt de Roumare (76)

- 1 le 28 avril à Saint-Pierre-de-Manneville ; 1 s'envole d'un arbre (où un nid est déjà connu).
- 3 juvéniles volants et 1 adulte le 5 juillet sur un nid (même site que l'observation du 28 avril)
- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 3 août, près du nid déjà noté les 28 avril et 5 juillet.

En forêt de La Londe (76)

- 1 criant le 2 mars, près d'un nid
- 1 femelle à l'aire le 17 mai, même site
- 1 juvénile à l'aire le 11 juin, même site

En forêt de Brotonne (76)

- 1 le 11 mai, à Vatteville la rue, avec cris près d'une aire
- 1 juvénile au nid le 5 juin, même site
- 2 juvéniles volants et 1 adulte le 7 juillet, près du nid, même site.

2014 :

- 1 le deux février à Brémontier-Merval (bois de Bellozanne, pays de Bray, 76) avec alarmes à deux reprises, puis 2 juvéniles vus au sol sur une proie (un pigeon voyageur bagué) le 13 juillet, avec alarme d'un adulte au-dessus.
- 1 le 28 février à Gaudreville-la-Rivière (27), dans un bois entre Evreux et Conches, femelle vue près d'une aire.
- 1 juvénile au nid le 27 juin à Montville (76), dans les bois bordant la vallée du Cailly.

Forêt du Longboël (la Neuville-Chant-d'Oisel)

- 1 adulte le 3 avril (peut-être femelle) dans le sous-bois.
- 1 mâle probable le 13 avril, cercle au-dessus des arbres.
- 1 le 4 mai en forêt du Longboël (La Neuville-Chant-d'Oisel, 76), avec cris spontanés, puis 2 juvéniles et 1 adulte le 6 juillet, avec cris.
- 2 le 27 avril avec cris spontanés.
- 2 le 29 juin avec cris, dont un mâle vu s'envolant d'un arbre.

Forêt de Lyons

- 1 femelle sur une aire connue, à La Haye (76), le 17 mai.
- 1 femelle debout sur l'aire à Bézancourt (76) le 17 mai.
- 1 adulte en vol, à Bézancourt dans le même secteur, le 8 novembre.

Forêt de Roumare

- 1 le 16 février à Saint-Pierre-de-Manneville, avec alarmes à plus de 200 mètres du nid.
- 2 le 11 mai à Saint-Martin-de-Boscherville, femelle probablement en train de couvrir.
- 2 le 16 mai Saint-Martin-de-Boscherville avec le mâle alarmant en étant harcelé par des corneilles.
- 3 juvéniles au nid le 27 juin à Saint-Pierre-de-Manneville

Forêt de La Londe (76)

- 1 le 8 mai 2014 à La Londe, avec cris d'alarme du mâle près d'une aire déjà connue.
- 1 adulte en vol avec cris le 5 juillet à La Londe.

Forêt du Trait-Maulévrier (76)

- 2, dont 1 femelle avec cris, à Saint-Arnoult, près d'une aire occupée non connue avant.

Forêt d'Eawy (76)

- 1 avec cris à Pommeréval le 1^{er} juin, aire connue.
- 1 femelle avec cris, autre lieu de la même commune, le même jour.

Forêt des Andelys

- 2 mâles le 21 mars, à Bouafles (27) en forêt des Andelys, se poursuivant, non revus ensuite malgré des recherches.

Bécasseau de Temminck

2008 : 1 adulte le 2 mai à Réthoville.

2010 : 3 le 11 mai 2010 à Poses, et 1 le 17 mai 2010 au même endroit, peut-être un des trois vus le 11 mai.

2011 : 1 adulte le 14 août aux Ponts d'Ouve.

Bécasseau rousset

2009 : 1 juvénile le 4 septembre, à Réthoville (HCHN), seconde mention pour le site, après celle de 1997

2010 : 1 juvénile le 20 août 2010 à Réthoville (HCHN)

2011 : 2 juvéniles à Vrasville le 11 septembre (HCHN), et 1 le 25 octobre 2011 à Réthoville, commune voisine de Vrasville. Données toutes issues du même site côtier du Nord-Cotentin.

Bécasseau tacheté

1 juvénile le 9 septembre 2008 à Vrasville.

Bernache à cou roux

2 le 8 décembre 2014 à Portejoie (27), revues jusqu'au 10 février 2015, en boucle de Poses, en compagnie d'oies cendrées et de Bernaches du Canada.



Photo 2 : Bernaches à cou roux, décembre 2014, Poses (27) - (Photo Malvaud F.)

Bernache cravant du Groenland (ssp « Hrota », ou « à ventre pâle »)

1 le 20 janvier 2008 à Saint-Aubin-sur-mer (76).

Bernache cravant du Pacifique (ssp nigricans)

1 adulte le 24 décembre 2010 à Réville, dans le nord du Cotentin (Manche).

1 adulte le 7 décembre 2014 à Morsalines, rade de Saint-Waast-la-Hougue (50).

Bernache nonnette

2010 :

- A Beauguillot : 58 le 27 février ; 150 le 13 décembre ; 400 le 23 décembre.

- En Seine-Maritime à Saint-Aubin-sur-mer (embouchure du Dun) : 5 le 8 janvier, 250 le 23 décembre, et 150 le 26 décembre.

- Dans l'Eure : 1 le 9 novembre, et 45 (adultes et immatures) le 29 décembre, à Poses.

2011 :

250 le 22 janvier ; 150 le 5 mars, à Beauguillot.

2012 :

210 le 8 janvier ; 200 le 6 février 2012 à Beauguillot, vues jusqu'au 11 février.

1 le 29 juin 2012 à Courseulles-sur-mer (14), échappée probable, compte tenu de la date.

2013 :

31 le 13 janvier et 22 le 25 février, puis 67 le 17 novembre, à Beauguillot.

2014 :

160 le 21 novembre 2014 à Beauguillot.



Photo 3 : Bernaches nonnettes, janvier 2013, Beauguillot (50) - (Photo Le Marchand R.)

Blongios nain

2008 :

- 2 juvéniles le 7 janvier à Breuilpont (vallée de l'Eure, 27).
- 3 le 16 juin à Saint-Vigor-d'Ymonville (Marais du Hode, 76).
- 3 jeunes vus le 19 juillet, à Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), donc nidification certaine d'un couple.

2012 : 1 juvénile 26 août, à la tourbière d'Heurteauville (76). 1 juvénile le 27 septembre à Tournedos sur Seine (27).

Bruant lapon

2002 : 6 du 16 au 18 novembre, 1 le 23 novembre, à Réthoville.

2007 : 1 le 3 novembre, à Réthoville.

2009 : 5 le 2 novembre, puis 1 le 20 décembre, à Réthoville,

2010 : 2 le 28 mars à Réthoville, 2 le 6 septembre à Réthoville, 7 le 3 novembre à Courtils, 1 le 28 novembre à Réthoville, 3 le 1^{er} décembre à Réthoville.

2012 : 1 mâle le 7 novembre à Manvieux, près d'Arromanches (14), dans les landes et cultures du haut de la falaise.

2014 : 3 le 7 février à Cosqueville (50), dont un mâle avec des alouettes haussecols.

Bruant nain

2009 : 1 le 31 octobre à Gatteville (HCHN)

Busard pâle

2012 : 1 le 24 septembre à Octeville sur mer, près du Havre (76).



Photo 4 : Busard pâle, septembre 2012, Octeville sur mer (76) - (Photo Tessier D.)

Buse pattue

2010 : 1 juvénile le 14 novembre à Ernemont-sur-Buchy (76).

2011 : 1 immature à Avremesnil (sud-ouest de Dieppe, 76) le 21 janvier, vue jusqu'au 7 mars.

Circaète Jean le blanc

2011 : 1 le 9 juin à Sainte-Marguerite-sur-mer (76). 1 le 25 juillet au Marais-Vernier (27).



Photo 5 : Circaète, juin 2011, Sainte-Marguerite-sur-mer (76) - (Photo Bobenriether R.)

Corneille Mantelée

2008 : 1 le 8 avril au Havre, revue le 27 août 2008

2009 : 1 le 7 février à Antifer.

Cygne chanteur

2010 : 5 adultes le 21 janvier à Portejoie (boucle de Poses, 27). Revus le 23 janvier et le 15 février à Tournedos-sur-Seine, tout proche.

2011 : 1 le 15 janvier à Anneville-Ambourville (boucle de Mauny, vallée de la Seine, 76)

Cygne de Bewick

2013 : 1 adulte le 27 janvier à Quiberville, à l'ouest de Dieppe.

Erismature rousse

2008 : 1 mâle adulte le 8 décembre à Poses.

2009 : 1 le 25 janvier à Poses, peut-être le même oiseau que celui vu fin 2008.

2010 : 1 le 19 février à Tournedos sur Seine (boucle de Poses). 1 le 26 novembre à Poses.

Fuligule à tête noire

2008 : 1 femelle le 3 février à Berville-sur-Seine (boucle de Mauny, Seine-Maritime).

Fuligule nyroca

2008 : 1 mâle adulte le 19 janvier à Petit-Couronne (bassin des Docks), près de Rouen. 1 femelle le 25 février à Acquigny (27)

2010 : 1 mâle adulte le 4 janvier à Acquigny (27). 1 mâle adulte le 1^{er} décembre à Ecardenville-sur-Eure (entre Evreux et Gaillon)

Gobemouche noir

2010 : 1 mâle le 12 avril à Canville-la-Roque (50)

Goéland à ailes blanches

2009 : 1 le 26 mars à Luneray (intérieur du pays de Caux, 76)

Goéland bourgmestre

2009 : 1 le 1^{er} février à Dieppe.

2010 : 1 trouvé mort à Dieppe le 15 février.



Photo 6 : Goéland bourgmestre, février 2009, Dieppe (76) - (Photo Turban R.)

Goéland pontique

2009 : 1 le 21 février à Dieppe.

2011 : 1 adulte le 9 janvier à Cléon (76, près d'Elbeuf, vallée de la Seine).

Grue cendrée

2014 : 300 le 4 novembre en vol en deux groupes vers le Sud, à Montville (76).

Guêpier d'Europe

2007 : 3 le 10 mai à Londinières (pays de Bray, 76), en vol.

Guifette leucoptère

2012 : 1 le 5 mai à Tournedos-sur-Seine (27), avec des guifettes noires. 1 immature le 26 août, à Cosqueville (50), avec des guifettes noires.

Guifette moustac

2008 : 1 le 8 mai à Poses.

2010 : 1 le 26 mars, 1 le 20 avril, et 1 le 27 mai, à Poses. Peut-être le même oiseau ?

Guillemot à miroir

2008 : 1 juvénile le 7 décembre à Antifer. 1 juvénile le 24 décembre à Antifer

2009 : 1 le 7 février à Antifer, probablement le même qu'un des deux de fin 2008. 1 juvénile le 12 novembre à Antifer.

2010 : 1 juvénile le 27 août à Réthoville, revu le lendemain. 1 le 10 novembre à Gatteville.

2013 : 1 adulte en plumage adulte internuptial à Gatteville le 30 novembre.

Harelde boréale

2010 : 1 femelle le 15 décembre 2010 à Réthoville. 1 le 22 décembre à Poses.

2011 : 1 mâle en plumage hivernal le 15 janvier à Poses

2014 : 1 le 14 novembre à Omonville-la-Petite (50), anse Saint-Martin.

Harfang des neiges

2009 : 1 le 21 avril à Réthoville, non revu le lendemain.

Héron gardeboeufs

Les données de cette espèce sont intégrées directement dans le fichier sans nécessité de description, compte tenu de la fréquence croissante des observations, qui ne sont donc pas détaillées ici. Elle sera retirée de la liste des espèces dont les données doivent être homologuées lors de la prochaine révision de la liste.

Hypolaïs icterine

2007 : plusieurs observations dans le même site du pays de Bray (76), à Cuverville-sur-Yères : 1 chante le 27 mai, puis observation d'un individu le 2, puis le 9, puis le 15. L'observateur n'a pas mentionné si l'oiseau chantait à chaque fois. Toujours est-il que la nidification semble peu probable. Pas d'autre donnée les années suivantes.

Ibis falcinelle

2012 : 1 immature le 19 août à Beauguillot.

2014 : 2 le 24 février à Néville-sur-mer, au Nord-Est du Cotentin, dans une prairie inondée d'arrière dune.

Ibis sacré

2008 : 1 le 21 octobre à Geffosses (côte ouest du département de la Manche).

Jaseur Boréal

2005 : 22 le 12 mars à Vatteville-la-Rue (76)

2007 : 1 le 5 janvier à Mont-Cauvaire (nord de Rouen).

2010 : 2 le 23 octobre à Théville (nord du Cotentin). 1 le 16 décembre 2012 à Longueil, à l'ouest de Dieppe.

Labbe à longue queue

2010 : 1 à Gatteville (juvénile à chaque fois) le 25 août, puis le 15, le 17, et enfin le 18 septembre.

2011 : 2 juvéniles le 8 octobre à Gatteville.

2013 : 1 juvénile à Gatteville le 10 octobre, et 1 autre juvénile le 15 novembre.

2014 : 1 juvénile à Gatteville le 21 septembre

Linotte à bec jaune

2014 : 1 le 2 novembre à La Poterie-Cap-d'Antifer, près du phare. Repérée d'abord au cri.

Locustelle lusciniöïde

2008 : 1 chante le 5 avril 2008 à Meuvaines (marais de Ver-Meuvaines, 14).

2011 : 1 chante à Tancarville (estuaire de la Seine, 76) le 7 mai 2011.

2012 : 1 chante le 20 juin 2012 à Saint-Vigor-d'Ymonville (marais du Hode).

2013 : 1 le 21 août 2013, baguée à Montmartin-en-Graignes (marais de Carentan, 50).

2014 : 2 chantent le 18 mai 2014, à Saint-Vigor-d'Ymonville (marais du Hode, 76).

Ces données ne reflètent bien entendu pas la population nicheuse de l'espèce, dont le chant est difficile à reconnaître, la population étant de plus très localisée dans des sites difficiles d'accès.

Macareux moine

2010 : 1 le 10 novembre à Gatteville.

2011 : 1 le 8 octobre à Gatteville.

Marouette ponctuée

2001 : 1 le 18 mai à Quevillon (boucle de Roumare, en aval de Rouen). Il s'agit d'une donnée ancienne qui n'était pas encore dans la base.

2009 : 1 immature le 9 août aux Ponts d'Ouve, revue le 15 août. 2 le 30 août à Sallenelles.

2012 : 1 le 12 août, revue le 17 août, aux Ponts d'Ouve.

Martinet à ventre blanc

2010 : 1 le 26 mars à Bretteville, près de Cherbourg (Manche)

Mésange à longue queue « à tête blanche »

2010 : 10 le 18 novembre à Dieppe.

Moineau friquet (cf. note en introduction)

2013 : 2 le 14 mars à Allouville-Bellefosse (76)



Photo 7 : Moineau friquet, mars 2013, Allouville-Bellefosse (76) - (Photo Jacques J.-P.)

Mouette de Sabine

2007 : 1 adulte le 9 septembre à Antifer.

2009 : 1 juvénile à Auderville (Nord-Cotentin) le 19 novembre.

2014 : 1 adulte le 31 août à Gatteville.



Photo 8 : Mouette de Sabine, novembre 2009, Auderville (50) - (Photo Pesquet E.)

Océanite culblanc

2009 : 1 le 29 novembre à Poses.

2011 : 1 le 6 novembre à Gatteville.

2013 : 3 le 12 octobre à Gatteville. 1 le 30 novembre à Gatteville

2014 : 1 le 23 novembre sur le lac des Deux amants, à Poses (27). Les données de l'intérieur sont remarquables car particulièrement rares.

Océanite tempête

2008 : 4 le 8 juillet au large de Granville (50).

Oie à bec court

2008 : 2 le 2 février à Poses (HCHN)

2010 : 1 adulte le 13 décembre à Beauguillot. Observée jusqu'au 12 février 2011 (HCHN).

2014 : 1 le 1^{er} février à Beauguillot, avec des oies cendrées (HCHN).

Oie des moissons

2009 : 30 (sous-espèce *rossicus*) le 4 janvier à Poses, avec d'autres oies grises.

2011 : 7 le 3 janvier à Beauguillot.

Oie naine

2009 : 1 le 4 janvier à Poses, avec d'autres oies grises (HCHN).

Oie rieuse

2009 : 25 le 4 janvier à Poses avec d'autres oies grises. 1 adulte le 27 novembre à Saint-Aubin sur mer (76),

2010 : A Beauguillot : 15 le 6 février, et au moins jusqu'au 11 février ; puis l'hiver suivant 13 le 13 décembre 2010 et 80 le 24 décembre 2010 ; et 80 étaient vues le 3 janvier **2011** toujours au même endroit.

2013 : Toujours à Beauguillot, 1 le 25 octobre

2014 : 13 le 3 février dont 10 adultes, à Beauguillot.

Comme précisé dans la section I, il a été décidé début 2015 de ne plus homologuer les oies rieuses observées sur Beauguillot, du fait de leur régularité.

Phalarope à bec étroit

2008 : 1 juvénile le 2 octobre à Bréhal (50), aux bassins de lagunage des Tanguières.

Phalarope à bec large

2008 : 1 juvénile le 4 septembre 2008 à Gatteville. 1 juvénile le 5 septembre à Réthoville. Les deux sites étant très proches, il s'agit peut-être du même individu.

2010 :

- 1 le 16 janvier à Sainte-Marie du-Mont (50),

- 1 le 27 août à Vrasville, 1 le 4 septembre à Vrasville,

- 1 le 10 novembre à Gatteville.

2011 : 1 à Beauguillot le 16 janvier ; 1 le 23 décembre 2011 à Saint-Arnoult (basse vallée de la Touques, 14).

2013 : 1 le 3 novembre à Vauville (50).

2014 : 2 juvéniles le 12 novembre à Auderville (50), et 1 adulte le 15 novembre à Antifer.



Photo 9 : Phalarope à bec large, novembre 2014, Auderville (50) – (Photo Pesquet E.)

Phragmite aquatique

2009 : 1 juvénile le 27 août à Saint-Côme-du-Mont (50).

2013 : 1 le 21 août à Montmartin-en-Graignes, marais de Carentan (50), donnée de baguage.



Photo 10 : Phragmite des joncs juvénile et phragmite aquatique adulte août 2013, Montmartin-en-Graignes (50) – (Photo Jarry J.-C.)

Pic cendré

2011 : 1 le 2 avril à Tourouvre, en forêt du Perche (61).

Pie-grièche à tête rousse

2008 : 1 femelle le 20 mai à Tosny, boucle des Andelys (27).

2012 : 1, avec deux couples de pies-grièches écorcheurs, à Notre-Dame -de-l'Isle (nord de Vernon, 27) le 23 mai.

2013 : 1 (avec doute sur le sexe) le 15 mai à Bouafles (27)

Pipit de Richard

2011 : 1 le 30 octobre à Réthoville.

2014 : 1 le 12 octobre près du phare d'Antifer, en vol dans un groupe de pinsons et de pipits farlouses.

Pluvier guignard

2010 : 1 juvénile le 31 août, et un (préssumé autre) le 10 septembre à Réthoville.

2011 : 4 le 5 mai à Surville, sur la côte ouest du département de la Manche.



Photo 11 : Pluvier guignard, mai 2011, Surville (50) – (Photo Le Marchand R.)

Pouillot à grands sourcils

2013 : 1 juvénile le 17 octobre à Gatteville, dans un jardin.

Pouillot véloce de type sibérien

2009 : 1 le 2 janvier 2009 à Geffosses (50). 1 le 16 décembre à Hautot-sur-mer (juste à l'ouest de Dieppe).

Puffin majeur

2010 : 1 le 18 septembre à Gatteville.

Râle des genêts

2012 : 1 chanteur entendu du 2 au 7 juillet, à Bardouville (boucle de la Seine d'Anneville-Ambourville, 76). A cette date, et s'il n'a pas été détecté avant dans la saison, il s'agit très certainement d'un non nicheur venant d'ailleurs.

2014 : 1 entendu au Mesnil-sous-Jumièges (76) à 22 heures le 14 juin, qui n'a pas répondu à la repasse. Et un entendu le 3 juillet puis le 6 juillet dans une autre prairie de la même commune, où l'espèce nichait encore dans les années 1990. Il s'agit probablement de deux individus différents compte tenu de l'intervalle de temps entre les deux observations, même si elles sont relativement proches géographiquement. L'abondance de l'eau cette année-là a sans doute favorisé la présence de l'espèce, qui n'est cependant là que « nicheur possible ».

Rémiz penduline

2011 : 2 le 25 mars à Poses.

2012 : 9 le 21 février à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27), à la station de lagunage, vues jusqu'au 20 mars.

2014 : 1 adulte le 5 août à Merville-Franceville (estuaire de l'Orne, 14).



Photo 12 : Rémiz penduline, 21 février 2012, Saint-Aubin-sur-Gaillon(27) – (Photo Basley D.)

Rousserolle turdoïde

2012 : 1 le 18 mai à Bernières-sur-Seine (27)

Sterne arctique

2009 : 7, tous juvéniles, le 11 octobre, à Saint-Jouin-Bruneval.

2011 : 3 le 18 septembre, et 1 le 25 octobre, à Gatteville, toutes immatures.

2012 : 1 le 30 septembre à Sainte-Marguerite-sur-mer (76)

2013 : 1 le 10 octobre et 1 le 11 octobre à Gatteville, puis 2 très tardives le 14 novembre.

2014 : 1 juvénile, avec des sternes pierregarins, le 31 août, ainsi que le 24 septembre.

Sterne caspienne

2008 : 1 adulte le 4 mai à Bretteville (juste à l'est de Cherbourg). 1 le 11 juin aux Damps (27), au confluent de l'Eure et de la Seine, au sud-est de Rouen.

2011 : 1 adulte le 2 octobre à Sainte-Adresse, près du Havre (76).

L'observation faite aux Damps dans la vallée de la Seine, très à l'intérieur des terres, est tout à fait inhabituelle tant au point de vue de la date que du lieu.

Traquet du désert

2011 : 1 le 19 novembre à Gatteville (50), revu le lendemain (HCHN).



Photo 13 : Traquet du désert, novembre 2011, Gatteville (50) – (Photo Verneau A.)

V. Liste des observateurs

Marius APRILE	Eric GESQUIERE	Chris MURRAY
Daniel BASLEY	Agnès GREGE	Michel PANSIOT
Louis BELLEFONTAINE	Richard GREGE	Elisabeth PESQUET
Antonin BENARD	Anthony GUERARD	Didier PODEVIN
Jean-Luc BIGORNE	Olivier GUILLEMET	Françoise POUILLOT
Renaud BOBENRIETHER	Stéphane HELOUIN	Bruno QUESNE
Jean-Louis BONAY	Jean-Luc HERELLE	Mme RANDRIAT
Patrick CORNETTE	Gérard HERPEIGNIES	Abdenour REZZOUK
Guy CORTEEL	Jean-Pierre JACQUES	Alain ROULLEAU
Thierry COSQUER	Jean-Claude JARRY	Régis ROUSSEL
Yvon CREAU	Françoise LATY	Thierry RUELLE
Eric DELARUE	Catherine LAVOISIERE	Gabriele SCHNEIDER
Sylvie DEZAILLES	Raymond LE MARCHAND	Denis TESSIER
Sarah DUBOSC	Benoît LECUYER	Jean-Paul THOREZ
Jean-Michel DUBOSC	Stéphane LEMIERE	Dominique THOREZ
Jean-Pierre DULONDEL	Nicolas LERY	Lionel TRIBOULIN
Marc DUVILLA	Richard LERY	Rémi TURBAN
Nicole DUVILLA	Dominique LOIR	Bernard VAUTRAIN
Hervé ELLERON	Frédéric MALVAUD	Alain VERNEAU
Armand FARRACHI	Jean-Pierre MARIE	Véronique VERNEAU
Anne-Laure FRODELLO	Thomas MORCRETTE	Gilbert VIMARD
Jean-Michel GANTIER		Julien YVON

Avec nos excuses aux observateurs éventuellement oubliés ici.

VI. Liste des données non homologuées (généralement pour description insuffisante, sinon voir commentaire joint)

- Pipit de Richard, Réthoville (50), les 16 et 18 novembre 2002
- Goéland pontique, Poses (27), le 12 juillet 2009
- Bécasseau tacheté, Poses (27), le 2 juin 2010
- Oie des moissons, Tournedos-sur-Seine (boucle de Poses, 27), le 26 septembre 2010
- Bruant lapon, Hermanville (76), le 1^{er} novembre 2010
- Jaseur boréal, Luneray (76), le 25 janvier 2011
- Goéland pontique, Poses (27), le 14 février 2011
- Pouillot véloce du type sibérien, Allouville-Bellefosse (76), le 5 novembre 2011
- Goéland pontique, Poses (27), le 12 février 2012
- Elanion blanc, Gisors (27), le 2 avril 2014
- Pipit rousseline, Saint-André-de-l'Eure (27), le 19 juin 2014 (date incohérente et description insuffisante)
- Goéland à bec cerclé, Saint-Jouin-Bruneval (76), le 30 octobre 2014
- Pipit rousseline, Octeville-sur-mer (76), le 15 novembre 2014 (date trop tardive et description insuffisante)

VII. Liste des espèces dont les données nécessitent une homologation par le CHR

Alouette haussecol	Macareux moine
Autour des palombes	Marouette ponctuée
Bécasseau de Temminck	Mergule nain
Bernache nonnette (sauf à Beauguillot)	Mésange boréale
Blongios nain	Moineau friquet
Bruant lapon	Océanite culblanc
Cygne chanteur	Oie des moissons
Cygne de Bewick	Océanite tempête
Érismature rousse	Phalarope à bec étroit
Fuligule nyroca	Phalarope à bec large
Goéland pontique	Phragmite aquatique
Grimpereau des bois	Pic cendré
Guêpier d'Europe	Pipit rousseline
Guifette moustac	Plongeon imbrin
Harelde boréale	Pluvier guignard
Héron gardeboeufs	Pouillot de Bonelli
Hypolaïs ictérine	Râle des genêts
Jaseur boréal	Rémiz penduline
Labbe à longue queue	Rousserolle turdoïde
Linotte à bec jaune	Sterne arctique
Locustelle lusciniöide	

Article soumis en janvier 2016