



## LES SERPENTS EN NORMANDIE

Nom	Nom latin	Description	Critères d'identification	Confusion possible	Milieu	Statut en Normandie	Fréquence en Normandie
Coronelle lisse	<i>Coronelle austriaca</i>	Dos gris marron avec deux rangées de taches noires par paires Bande noire de la narine jusque derrière l'œil Ventre gris ou foncé Taille adulte : 65-70 cm	Ligne foncée de la narine jusqu'aux écailles tympaniques Dos et flancs jamais rosâtres Pupille ronde. Grandes écailles sur la tête	-	Milieus rocailleux, landes, pelouses sèches, haies, talus	Quasi menacée	Rare
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	Dos vert olive, gris ou marron avec barres verticales noires sur les flancs Collier blanc et noir en croissants sur le cou qui se rejoignent sur la nuque Ventre : coloration en damier blanc/jaune et noir Barres noires aux sutures des écailles labiales supérieures Taille adulte : environ 65-85 cm	Pas de « zigzag » sur le dos Pupille ronde. Grandes écailles sur la tête Collier blanc et noir Barres noires aux sutures des écailles labiales supérieures Affectionne les plans d'eau pour chasser les batraciens Queue longue dans le prolongement du corps	Avec la Couleuvre d'Esculape juvénile	Zones humides, plans d'eau, cours d'eau, tourbières	Préoccupation mineure	Commune
Couleuvre d'Esculape	<i>Zamenis longissimus</i>	Dos marron plus ou moins foncé Ventre jaunâtre Juvénile : tachetures longitudinales sur dos gris ou gris vert. Bande noire derrière l'œil. Collier jaune Taille adulte : environ 1-1,20 m (mâles un peu plus grands)	Pupille ronde. Grandes écailles sur la tête Dos marron d'aspect uni Queue longue dans le prolongement du corps Peut se trouver dans les arbres	Pour les juvéniles avec la Couleuvre à collier	Coteaux rocheux, prairies, lisières forestières (tendances arboricoles)	Vulnérable	Rare à assez rare en Cotentin Commune à assez commune dans l'Orne. Absente ailleurs
Vipère aspic	<i>Vipera aspis</i>	Dos variable : jaune à rouge brique, ou gris ou brun Dessins foncés de formes variables sur le dos Nez retroussé Taille : 50-85 cm	Corps trapu avec queue courte Nez retroussé Pupille verticale, iris entièrement non rouge Petites écailles sur la tête	Avec la Vipère péliade	Chaud et sec Friches, lisières et haies exposés au soleil.	Quasi menacée	Très rare à exceptionnel dans le Cotentin et l'Orne. Absente ailleurs
Vipère péliade	<i>Vipera berus</i>	Dos gris marron avec un zigzag foncé bien marqué Taches sombres sur les flancs qui alternent avec le zigzag Souvent une tache en X ou V retourné sur l'arrière de la tête Iris orange à rouge Taille adulte : 55-60 cm	Museau arrondi ou carré Zigzag foncé bien marqué sur le dos Pupille verticale, iris entièrement rouge Petites écailles sur la tête	Avec la Vipère aspic	Landes, tourbières, zones humides, bocages, milieux forestiers ouverts	En danger	Assez commune