

Les oiseaux rares en Normandie de 2015 à 2019

**Rapport du Comité d'Homologation Régional (CHR)
de la LPO-Normandie.**

Par Frédéric Malvaud

CE RAPPORT EST LE DERNIER du genre puisqu'à partir de 2020 les deux CHR normands (LPO Normandie et GONm) ont fusionné suite à la création du portail Faune Normandie. Le présent rapport fait donc le bilan des données d'oiseaux rares dans le fichier de la LPO Normandie de 2015 à 2019, les années précédentes ayant été analysées dans le rapport précédent (Lery 2016).

Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

Cette espèce montagnarde vient très rarement en plaine dans le nord de la France en hiver.

- 2 oiseaux ont séjourné en janvier et février 2019 sur le Mont-Saint-Michel.



Accenteur alpin (@ F. Malvaud)

Aigle botté (*Aquila pennata*)

Cet aigle se reproduit en France dans les Pyrénées, le Massif central et de manière dispersée dans les grandes forêts du centre du pays. Des oiseaux erratiques s'aventurent de temps en temps au nord de cette zone.

- 1 individu en phase claire le 3/09/2018 à Saint-Nicolas-de-Pierrepont (50).

Alouette haussecol (*Eremophila alpestris*)

Cette alouette nordique est régulièrement observée sur les côtes normandes en hiver.

- 1 individu le 19/11/2016 à Saint-Jouin-Bruneval (76).
- 9 à 12 individus du 10/01/2017 au 20/03/2017 à Réthoville (50).
- 2 individus le 3/11/2019 à Bricqueville-sur-Mer (50).



Alouette haussecol (@ F. Malvaud)

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

L'Autour est un nicheur rare mais en augmentation dans tous nos grands massifs forestiers. Pendant la période étudiée, des couples ont été suivis dans les forêts suivantes : Brotonne, Le Trait, Lyons, Eawy, Roumare, Montfort-sur-Risle mais aussi dans des massifs plus petits comme la forêt de Bosville-Grainville la Teinturière dans le Pays-de-Caux, La Neuville-Chant-d'Oisel, les bois de la vallée de l'Iton au nord d'Evreux ou la forêt de Jumièges.

- 1 individu en hivernage à Gorges (50) le 11/01/2016.

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)

Ce petit bécasseau nordique (nord de l'Europe et montagnes scandinaves) est un migrateur rare mais régulier en Normandie aux deux passages de printemps et d'automne.

- 1 oiseau le 25/08/2019 à Sainte-Marguerite-sur-Mer (estuaire de la Saône, 76).

Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*)

Espèce nord-américaine, ce bécasseau s'aventure très rarement en Europe, suite à des tempêtes qui ont détourné des individus de leur route migratoire.

- 1 oiseau le 11/09/2017 à Saint-Côme-du-Mont (50), réserve des Ponts-d'Ouve.

Bergeronnette printanière « des Balkans » (*Motacilla flava feldegg*)

Cette sous-espèce (ou espèce propre suivant les auteurs), originaire des Balkans est observée occasionnellement plus à l'ouest.

- 1 mâle le 24/06/2019 à Geffosses (50).



Bergeronnette printanière « des Balkans »
(@ A. Cordonnier)

Bernache cravant « du Pacifique » (*Branta bernicla nigricans*)

Issus de la partie nord-ouest de l'Amérique du Nord ou de l'extrémité orientale de la Russie, des individus suivent des groupes de Bernaches cravant sibériennes jusqu'en Europe de l'Ouest.

- 1 individu le 27/01/2015 à Gatteville-le-Phare (50).
- 1 individu le 19/12/2017, puis le 28/02/2018 à Réville (50).



Bernache cravant « du Pacifique » (@ F. Malvaud)

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

Espèce devenue très rare et nicheur irrégulier en Normandie.

- 1 individu le 7/08/2015 à Grosseoeuvre (27), sans aucun doute un migrateur arrêté sur une petite zone humide du plateau de Saint-André-de-l'Eure.

Bruant lapon (*Calcarius lapponicus*)

Rare hivernant, mais qui passe souvent inaperçu.

- 1 oiseau le 17/12/2016 à Sainte-Marguerite-sur-Mer (estuaire de la Saône, 76).
- 10 oiseaux le 18/09/2017 sur le même site, jusqu'au 9/11.
- 1 oiseau le 21/10/2019 à Réville (50).

Busard pâle (*Circus macrourus*)

Migrateur rare, mais en augmentation en Europe de l'Ouest. Vient des steppes orientales.

- 1 juvénile le 28/08/2017 à Sainte-Marguerite-sur-Mer (estuaire de la Saône, 76).
- 1 femelle le 14/04/2019 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot, 50).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

Des individus sont vus annuellement en Normandie, souvent en fin de nidification pendant l'été. La date est donc précoce dans l'année.

- 1 individu en erratisme le 16/05/2019 à Auvilliers (76), au sud de la forêt d'Eu.

Corneille mantelée (*Corvus cornix*)

Trois populations sont susceptibles d'« envoyer » des oiseaux en erratisme en France ; des oiseaux issus des populations nordiques (de plus en plus rares en hivernage), des oiseaux en provenance des populations italiennes (dans le sud de la France) et des oiseaux issus des populations britanniques. C'est certainement le cas pour cet oiseau.

- 1 individu le 24/01/2019 à Lessay (50), revu le 7/11 de la même année sur le même site.



Corneille mantelée (@ F. Malvaud)

Elanion blanc (*Elanus caeruleus*)

L'augmentation de la population nicheuse en France conduit à des observations de plus en plus régulières au nord de sa distribution (sud-ouest du pays).

- 1 oiseau le 1/04/2019 à Tostes (27), revu le 3/04.

Fuligule à tête noire (*Aythya affinis*)

Ce canard nord-américain s'aventure régulièrement en France.

- 1 oiseau le 10/02/2019 à Poses (27).

Goéland à ailes blanches (*Larus glaucoides*)


Ce goéland arctique, originaire du Groenland et du nord du Canada est rarement vu en hivernage, mais régulièrement toutefois, en France.

- 1 oiseau le 11/01/2015 à Dieppe (76).
- 1 oiseau le 25/04/2016 à Rouen (76).

Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*)

Ce goéland arctique, plus commun que le précédent, originaire d'Islande ou de Russie, peut être vu un peu n'importe quand, car des individus (souvent immatures) peuvent rester estiver en Europe occidentale.

- 1 oiseau d'un an le 29/07/2015 à Poses (27).
- 1 oiseau le 23/06/2016 à Port-en-Bessin-Huppain (14).
- 1 oiseau d'un an le 21/05/2017 à Saint-Côme-du-Mont (Les Ponts-d'Ouve, 50).
- 1 oiseau d'un an le 9/02/2018 à Fermanville (50).



Goéland bourgmestre (@ H. Nicolas)

Goéland pontique (*Larus cachinnans*)

Cette espèce orientale est observée de plus en plus fréquemment en France. Comme pour les 4 observations suivantes, il s'agit souvent d'oiseaux immatures.

- 1 oiseau d'un an le 11/11/2016 à Poses (27).
- 1 oiseau d'un an le 5/09/2018 à Gatteville-le-Phare (50).
- 1 oiseau d'un an le 9/11/2018 à Poses (27).
- 1 oiseau d'un an le 12/05/2019 à Rouen (76).

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)

Cette espèce maintient une petite population dans les grandes forêts de l'Orne.

- 1 oiseau le 11/02/2017 à Bagnoles de l'Orne (forêt des Andaines 61).
- 3 couples le 23/03/2019 à Saint-Patrice-du-désert (forêt des Andaines 61).
- 5 couples le 24/03/2019 à La Sauvagère (forêt des Andaines 61).

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)

Une petite population reproductrice s'est installée en Normandie entre 2014 et 2016, d'abord dans le Bessin (Port-en-Bessin-Huppain) sur une petite rivière, puis dans les dunes du Cotentin. Les oiseaux ont déserté les sites en 2017, probablement suite à des printemps trop froids et humides pour la réussite des couvées.

- Port-en-Bessin-Huppain (14) : jusqu'à 5 couples et un maximum de 26 individus le 8/08/2015.
- A Héauville, Vasteville, Sainte-Marie-du-Mont, Portbail (Cotentin, 50). 5 couples et maximum de 12 individus le 22/08/2015 à Héauville.

En plus de ces oiseaux, des migrateurs occasionnels peuvent être observés ici ou là.

- 7 individus le 3/05/2018 à Emanville (27).



Guêpier d'Europe (@ F. Malvaud)

Harelde boréale (*Clangula hyemalis*)

Ce canard nordique est observé régulièrement en hivernage sur les côtes du nord-ouest du pays.

- 1 oiseau le 28/11/2016 à Gatteville-le-Phare (50).

Ibis falcinelle (*Plegadis falcinellus*)

Depuis l'augmentation importante des effectifs nicheurs camarguais, l'Ibis falcinelle s'aventure de plus en plus souvent au nord du pays. Les individus suivants ont été observés :

- 1 le 27/12/2015 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 1 le 29/01/2017 sur le même site.
- 1 le 3/08/2017 à Saint-Vigor-d'Ymonville (estuaire de la Seine 76).
- 1 le 4/12/2017 à Saint-Fromond (marais du Cotentin 50).
- 1 le 11/01/2018 à Colleville (vallée de la Valmont 76).
- 1 le 3/03/2018 à Saint-Vigor-d'Ymonville (estuaire de la Seine 76).
- 1 le 31/03/2018 à Dragey-Ronthon (50).

Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*)

Espèce probablement plus commune qu'on ne le pense. Des oiseaux passent régulièrement sur le littoral normand à l'automne mais ils sont difficiles à différencier des autres espèces de labbes (parasite et pomarin).

- 1 juvénile le 15/10/2015 à Gatteville-le-Phare (50).
- 1 juvénile le 1/12/2017 à Gatteville-le-Phare (50).

Locustelle lusciniöide (*Locustella luscinioides*)

Cette fauvette se reproduit essentiellement en Normandie dans les grandes roselières de l'estuaire de la Seine (76). Des couples isolés peuvent s'installer ailleurs, souvent de manière non pérenne.

- Dans l'estuaire de la Seine, 2 données en 2015, 1 en 2016, 5 en 2017, 2 en 2019.
- 1 couple dans la roselière de Pirou (50) en 2016.

Mergule nain (*Alle alle*)

Ce petit alcidé est vu régulièrement au passage d'automne lors de coups de vent à partir du site d'observation en mer de Gatteville-le-Phare.

- 2 individus le 7/11/2016 sur ce site.
- 1 individu le 29/11/2017 sur ce site.

Mésange boréale (*Poecile montanus*)

Cette espèce nordique a pratiquement disparu de Normandie. Des hivernants sont encore vus occasionnellement ici ou là.

- 1 oiseau fréquente une mangeoire lors de l'hiver 2017/2018, observé du 15/12/2017 au 18/03/2018 à Guichainville (27), en périphérie d'Evreux.



Mouette de Sabine (*Xema sabini*)

Cette mouette arctique est observée annuellement lors des guets à la mer sur les points d'observation (Antifer, Gatteville).

- 1 adulte le 17/09/2017 à Gatteville-le-Phare (50).
- 1 adulte le 26/09/2017 à Gatteville-le-Phare (50).

Océanite culblanc (*Oceanodroma leucorhoa*)

Ce petit oiseau marin s'observe régulièrement lors des coups de vent aux passages d'automne sur nos côtes. Les individus suivants ont été notés à Gatteville-le-Phare (50) :

- 1 le 4/12/2016.
- 1 le 17/09/2017.
- 1 le 13/11/2017.
- 1 le 28/10/2018.

Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*)

Cette oie très localisée se reproduit en Islande, au Spitzberg et au Groenland. Elle hiverne régulièrement dans les îles britanniques, aux Pays-Bas, en Belgique et au Danemark. Quelques oiseaux atteignent la France.

- 3 individus le 22/11/2015 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 1 individu le 30/10/2017 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 1 individu le 24/09/2018 à Poses (27).

Oie rieuse (*Anser albifrons*)

Cette oie sibérienne hiverne sur les côtes de l'Europe du Nord. Elle est rare mais régulière en France. Les individus suivants ont été observés :

- 13 le 8/01/2015 à Poses (27), 11 sur le même site le 11/01.
- 2 le 23/01/2015 à Saint-Aubin-sur-Mer (76).
- 19 le 8/02/2015 à Poses (27).
- 1 le 30/10/2017 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 3 le 5/01/2018 sur ce site.
- 7 le 30/10/2018 à Carentan (50).
- 2 le 10/01/2019 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 2 le 24/11/2019 à Poses (27).

Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*)

Nicheur en Scandinavie, ce Phalarope hiverne dans l'océan indien et a donc des voies migratoires orientales. Il est du coup nettement moins commun en Normandie que le Phalarope à bec large.

- 1 juvénile le 21/08/2017 à Bréhal (50).
- 1 juvénile le 23/09/2017 à Saint-Germain-sur-Ay (50).

Phalarope à bec étroit (@ LPO Normandie)



Phalarope à bec large (*Phalaropus fulicarius*)

Nicheur au Groenland et au Spitzberg, ce Phalarope hiverne en mer non loin des côtes atlantiques africaines. Il est observé régulièrement sur les côtes françaises au passage d'automne ou lors de coups de vent en hiver. Les individus contactés sont :

- 1 immature le 27/12/2015 à Sainte-Marie-du-Mont (réserve de Beauguillot 50).
- 1 immature le 10/09/2017 à Bréhal (50).
- 1 immature le 15/09/2017 à Arques-la-Bataille (76).
- 1 le 4/12/2018 à Poses (27).
- 1 le 21/10/2019 à Gatteville-le-Phare (50).



Phalarope à bec large (@ R. Lery)

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

Cette pie-grièche se reproduit dans le sud de la France et certains individus s'aventurent plus au nord lors de leur retour de migration printanière. Ce sont certainement des non reproducteurs.

- 1 individu le 15/05/2016 à Auvilliers (76).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

Cette pie-grièche nordique est de moins en moins observée en Normandie (nicheur éteint) en hiver ou aux passages. Notons les individus suivants :

- 1 le 10/03/2015 à Doville (marais de l'Adriennerie, 50).
- 1 le 8/11/2015 à Saint-Vigor-d'Ymonville (estuaire de la Seine, 76).
- 1 le 25/01/2017 à Heurteauville (76).
- 1 le 11/04/2018 à Bagnoles-de-l'Orne (61).

Pluvier Guignard d'Eurasie (*Eudromias morinellus*)

Ce pluvier nicheur dans les montagnes scandinaves est régulièrement observé aux passages migratoires (surtout à l'automne) en Normandie.

- 1 immature le 23/09/2015 à Vauville (50).
- 12 individus le 7/05/2017 à Cesseville (27).



Pluvier Guignard d'Eurasie (@ F. Malvaud)

Pouillot véloce de type sibérien (*Phylloscopus collybita tristis* ou *fulvescens*)

Ces pouillots véloces, bien reconnaissables par rapport aux pouillots véloces médioeuropéens (gris-brun clair sans traces de vert), ne sont pas clairement identifiables lorsqu'ils ne chantent pas (ce qui est souvent le cas !) - il n'est alors pas possible de définir le taxon (*tristis* ou *fulvescens* voire *abietinus*). On ne peut que définir leur origine orientale et/ou nordique. Ils peuvent alors concerner quelques populations orientales dont la sous-espèce (ou espèce ?) *tristis*, originaire de Sibérie, et de rares oiseaux hivernent en France.

- 2 individus le 6/04/2017 à Couvains (50).
- 4 individus le 9/04/2017 à Le-Hommet-d'Arthenay (50).
- 1 individu le 23/10/2019 à Agon-Coutainville (50).

Puffin cendré (*Calonectris diomedea borealis*)

Ce puffin niche à Madère, aux Canaries et quelques individus s'aventurent dans la Manche au passage d'automne.

- 2 oiseaux le 6/09/2017 à Gatteville-le-Phare (50).

Puffin majeur (*Puffinus gravis*)

Ce puffin niche sur les îles de l'atlantique sud et hiverne au large de l'Amérique du Nord ; quelques oiseaux fréquentent à l'automne les eaux européennes et de rares individus vont jusqu'en Manche.

- 1 oiseau le 17/09/2017 à Gatteville-le-Phare (50).

Pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*)

Hivernant très rare dans l'ouest de la France. Un immature a séjourné à Poses lors de l'hiver 2016-2017.

- 1 oiseau le 21/01/2017 à Poses (27), revu le 26/01.

Rôle des genêts (*Crex crex*)

Commun jusqu'au début du XX^e siècle en Normandie, le Rôle des genêts a pratiquement disparu de la région et quelques migrateurs sont contactés, cette fois-ci en des lieux inhabituels.

- 1 chanteur le 23/05/2015 à Saint-Julien-de-la-Liègue (Plateau de Madrie, 27).
- 1 chanteur le 28/05/2015 à Garencières (Plaine de Saint-André, 27).

La concomitance des deux données est remarquable (moins de 30 km d'écart et 5 jours d'intervalle).

Sizerin flammé (*Acanthis flammaea*) ou **Sizerin cabaret** (*Acanthis cabaret*)

Les oiseaux observés dans le nord-ouest de la France sont la plupart du temps des sizerins cabaret (mis à part lors de l'invasion de 1972/1973 où de nombreux sizerins boréaux (*flammaea*) sont apparus en Normandie), mais il est souvent difficile de différencier les deux taxons, surtout en fin d'hiver. Les individus suivants ont été observés :

- 5 le 12/03/2016 à Heurteauville (76).
- 1 le 19/03/2016 à Lieurey (27)
- 1 le 11/03/2017 à Morville-sur-Andelle (76).
- 8 le 26/11/2017 à Rosay-sur-Lieure (27)
- 11 le 10/12/2017 à Autheuil-Authouillet (27).
- 1 le 31/12/2017 à Sainte-Marguerite-sur-Mer (76).
- 2 le 18/02/2018 à Sotteville-lès-Rouen (76).
- 3 le 18/03/2018 à Guichainville (27), sizerins cabarets.
- 2 le 12/01/2019 à La-Ferté-Macé (61).
- 30 le 22/02/2019 à Courcelles-sur-Seine (27).

On note donc des observations concentrées en Haute-Normandie.

Sterne arctique (*Sterna paradisaea*)

Cette sterne est régulièrement observée au passage d'automne à partir des sites de guet à la mer (Antifer et Gatteville-le-Phare). Il s'agit le plus souvent de juvéniles. Les individus suivants ont été observés :

- 3 le 13/08/2015 à Antifer (76).

Et à Gatteville-le-Phare (50) :

- 1 juvénile le 5/08/2017.
- 3 juvéniles le 1/10/2018.
- 1 juvénile le 4/09/2019.
- 1 juvénile le 2/10/2019.
- 1 juvénile le 21/10/2019.

Sterne caspienne (*Hydroprogne caspia*)

Quelques oiseaux de la petite population suédoise sont régulièrement observés à l'automne. L'observation de 2017 est donc atypique.

- 1 individu le 12/06/2017 à Bouafles (27).

Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)

Cette sterne se reproduit essentiellement en Europe du sud et maintient une toute petite population au Danemark et en Allemagne. Ce sont ces oiseaux qui peuvent être vus rarement sur les côtes d'Europe de l'ouest lors de la migration d'automne.

- 1 adulte en plumage d'été le 12/09/2017 à Gatteville-le-Phare (50).

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)

Ce superbe oiseau de haute montagne peut s'aventurer sur les « falaises artificielles » de nos grands monuments urbains en hiver. Celui de Coutances (le même individu ?) hiverne sur la cathédrale depuis 2014.

- 1 individu le 18/01/2018 à Coutances (50).
- 1 individu le 8/01/2019 sur ce site.



Tichodrome échelette (@ A. Cordonnier)

Traquet isabelle (*Oenanthe isabellina*)

Ce traquet vient occasionnellement d'Europe orientale ou des steppes d'Asie centrale en Europe de l'ouest à l'automne. L'oiseau observé représente la première mention normande.

- 1 individu le 18/11/2018 à Fermanville (50).



Traquet isabelle (@ E. Willay)

Bibliographie

Lery R. 2016. Second rapport du Comité d'Homologation Régional (CHR) de la LPO Haute-Normandie : 2009-2014. *L'Oiseau Libre*. 9 :6-23.