

Bilan EOCC 2026

La LPO Normandie a lancé en mars 2026 un programme de sciences participatives ayant pour objectif de recenser les oiseaux communs dans un maximum de communes de la région : l'Étude des Oiseaux Communs des Communes. Il repose sur l'étude nationale lancée par la LPO France en 2017 : EPOC (Estimation des Populations d'Oiseaux Communs), par la réalisation de 2 points d'écoute de 5 minutes tirés aléatoirement au sein des communes, puis répétés au moins 3 fois entre mars et juillet (LPO Normandie, 2026a).

Lors de cette première année d'étude, 75 personnes réparties un peu partout dans la région ont participé et réalisé 599 points d'écoute dans 117 communes différentes (Figure 1). Les observateurs et observatrices ont réalisé en moyenne 7 points d'écoute, au cours desquels 9 espèces pour 15 individus, sont notées en moyenne. Ainsi, 119 espèces entre mars et juillet ont été inventoriées sur l'ensemble de la région, parmi elles seules 4 espèces ont été notées dans plus de 50 % des points : le Merle noir (63,9 %), le Pigeon ramier (63,1 %), le Pinson des arbres (59,1 %) et le Pouillot véloce (53,9 %). A l'inverse, 23 espèces n'ont été observées qu'une seule fois ; c'est le cas par exemple de la Gorgebleue à miroir, la Bondrée apivore ou encore la Fauvette babillarde (Tableau 1). Ces résultats sont similaires à ceux observés lors de l'analyse des EPOC normands, puisque 3 des 5 espèces les plus fréquentes sont communes aux résultats de l'EOCC et des EPOC : le Pigeon ramier (81,7 %), le Merle noir (58,2 %) et le Pinson des arbres (54,2 %), avec des fréquences dans les mêmes ordres de grandeurs (LPO Normandie, 2026b). A noter que les deux autres espèces les plus fréquentes dans les EPOC en période de reproduction : la Corneille noire et le Rougegorge familier apparaissent respectivement en 6^{ème} (43,2 %) et 8^{ème} (40,4 %) position des espèces les plus fréquentes dans les résultats de l'EOCC 2026. Si on compare ces résultats à l'*Inventaire des Oiseaux de Normandie*, 3 espèces apparaissent dans les 5 espèces les plus fréquentes, malgré des protocoles différents : le Merle noir qui est l'espèce la plus fréquente dans l'*Inventaire*, le Pigeon ramier (3^{ème}) et le Pouillot véloce (4^{ème}) (Lery et Malvaud, 2022).

Entre mars et juillet, 62 espèces sont notées avec un indice de reproduction probable ou certain et c'est le mois de mai qui est le plus riche avec 48 espèces. Parmi les espèces reproductrices, 49 sont communes ou très communes, ce qui s'explique par le protocole de point d'écoute court qui est adapté à la détection des espèces communes.

Il faut noter que sur les 599 points d'écoutes réalisés au cours de cette étude, 8 points ne présentent aucune espèce au cours des 5 minutes : 3 en avril, 4 en mai et 1 en juin. Ces points sont retrouvés dans le bocage et dans les zones urbaines non denses et réalisés en moyenne à 10h35. C'est un résultat plutôt étonnant étant donné qu'en général c'est une période très active en oiseaux chanteurs. Néanmoins l'horaire plus tardif dans la matinée, c'est-à-dire 3 à 4 heures après le lever du soleil peut expliquer cette absence d'activité. En effet, le pic d'activité se trouve dans les 2 à 3 premières heures après le lever du soleil, avant de décliner plus ou moins fortement selon les espèces (Robbins, 1981).

Comme le montre la carte (Figure 1) des points EOCC ont été réalisés dans les 5 départements normands. Ce sont l'Eure et la Seine-Maritime qui présentent le plus de communes prospectées avec respectivement 31 et 39 communes. Un vide est observé dans l'ouest de l'Orne et le sud de la Manche ; c'est dans le Calvados que le moins de points a été réalisé. Du côté du nombre d'espèces contactées par département, c'est en Seine-Maritime qu'il y en a eu le plus avec 90 espèces. A l'inverse, c'est la

Manche qui en présente le moins avec 51 espèces, mais c'est aussi le département avec le moins de points réalisés puisque 67 ont été réalisés contre 188 en Seine-Maritime.




Figure 1 : Localisation des points d'écoute réalisés au cours de l'EOCC 2026

Pour conclure, la première année de ce projet est une réussite puisque tous les départements normands ont été couverts, L'objectif de ce projet EOCC était de pousser les observateurs et observatrices à participer à un projet de science participative et les amener par la suite à faire des protocoles nationaux comme les STOC, EPOC, SHOC...

Si vous avez participé à ce projet, la LPO Normandie vous remercie et vous attend l'année prochaine pour la suite de EOCC. Enfin, pour les plus motivé(e)s et qui souhaiteraient aller plus loin que cette enquête, vous pouvez participer aux études nationales : STOC (Julliard & Jiguet, 2002) et SHOC (LPO France & MNHN, 2013) en contactant le coordinateur régional : Richard Grège - richard.grege@wanadoo.fr.

Vous pouvez également réaliser des points EPOC (5 minutes) partout où vous allez afin d'alimenter la base de données nationale. Toutes ces données sont très importantes pour la conservation, la préservation et la protection de l'avifaune. Elles permettent de suivre l'état des populations et alerter sur leurs déclin, participer à la réalisation de listes rouges ou encore améliorer les connaissances sur les communautés avifaunistiques locales.

Enfin, dans le cadre de projet d'urbanisation ou d'installations pouvant impacter la biodiversité, ces données seraient une base sur laquelle nous pourrions nous appuyer pour limiter l'impact de ces projets voire les annuler. Merci encore pour votre participation.

Bibliographie

JULLIARD, R., & JIGUET, F. (2002). *Un suivi intégré des populations d'oiseaux communs en France*. ALAUDA, (70), 137-147.

LPO FRANCE & MNHN (2013). *Suivi hivernal des oiseaux communs*. <https://www.vigienature.fr/fr/suivi-hivernal-des-oiseaux-communs-shoc>

LERY, R., & MALVAUD, F. (2022). *Inventaire des oiseaux de Normandie—2000—2021* (3ème édition).

ROBBINS C. S. (1981) *Effect of time of day on bird activity*. Studies in Avian Biology: Vol. 6, Iss. 1, Art. 6.

Annexes

Tableau 1 : Liste des espèces contactées au cours de l'EOCC 2026

LRM : Liste rouge mondial ; **LRE** : Liste rouge européenne ; **LRN** : Liste rouge française ; **LRR** : Liste rouge régionale (GONm, 2024) ; **R** : Rareté régionale de l'espèce ; **F** : Fréquence en pourcentage sur les 599 points EPOC réalisés ; **Nb max** : nombre maximal d'individus comptés sur un seul point ; **NB** : Nombre de données ; Nombre de données par mois (3 : mars ; 4 : avril ; 5 : mai ; 6 : juin ; 7 : juillet)

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LRM	LRE	LRN	LRR	R	F	Nb max	NB	3	4	5	6	7
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	LC	LC	LC	LC	TC	16,9	3	111	45	29	24	11	2
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	-	LC	LC	LC	R	0,3	10	2	1			1	
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	LC	LC	NT	LC	C	14,7	10	104	24	30	19	24	7
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	LC	LC	LC	NT	R	0,2	1	1				1	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	LC	LC	LC	LC	PC	1,3	4	8	1	3	2	1	1
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	LC	LC	LC	LC	C	6,8	5	44	12	16	5	9	2
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	LC	LC	LC	LC	PC	1,3	4	8		2	3	2	1
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	LC	LC	NA	NA	TR	0,3	11	2	1			1	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	LC	LC	LC	VU	AR	0,2	1	1				1	
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	LC	LC	NT	LC	PC	2,3	4	15	2	6	5	2	
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	LC	LC	VU	NT	C	1,7	2	11	4	1	3	2	1
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	LC	LC	EN	LC	PC	0,2	4	1				1	
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	LC	LC	VU	NT	C	5	4	30	6	6	10	5	3
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	LC	LC	NT	NT	C	1,2	1	7		1	3	3	
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	LC	LC	LC	LC	C	4,2	1	25	5	6	6	8	
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	LC	LC	NT	EN	TR	0,5	1	3		1		2	
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	LC	NT	LC	VU	AR	0,2	1	1			1		
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	LC	LC	LC	LC	PC	8	4	50	15	9	8	8	10
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	LC	LC	LC	LC	PC	0,2	1	1					1

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LRM	LRE	LRN	LRR	R	F	Nb max	NB	3	4	5	6	7
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	LC	LC	LC	LC	C	2,5	9	15	9	3	2		1
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	LC	LC	VU	LC	C	6,3	10	39	8	10	11	6	4
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	LC	LC	-	-	-	0,2	1	1					1
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	LC	LC	-	-	-	0,5	2	3		2			1
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	LC	LC	LC	LC	PC	0,8	2	6	4		1	1	
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	LC	LC	LC	LC	C	3,2	8	20	4	5	3	6	2
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	LC	LC	LC	LC	C	0,3	1	2	1		1		
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	LC	LC	LC	LC	R	0,2	1	1			1		
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	LC	-	VU	LC	AR	2,2	4	13	2	6	1	3	1
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	LC	LC	LC	LC	C	3,5	18	21	7	7	2	3	2
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	LC	LC	LC	LC	TC	43,2	82	293	85	73	59	51	25
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	LC	LC	LC	NT	C	6,2	2	37		7	23	7	
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,5	30	3			2	1	
Élanion blanc	<i>Elanus caeruleus</i>	LC	LC	VU	-	-	0,2	3	1					1
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	LC	LC	LC	LC	TC	11,5	30	71	15	18	19	17	2
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	LC	LC	LC	LC	C	12	2	75	10	29	20	14	2
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	LC	LC	NT	LC	PC	2,7	7	16	3	5	4	3	1
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	LC	LC	LC	NT	R	0,2	1	1					1
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	LC	LC	LC	LC	TC	42,7	5	279	13	88	99	71	8
Fauvette babillarde	<i>Curruca curruca</i>	LC	-	LC	LC	AR	0,2	1	1		1			
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	LC	LC	NT	LC	C	3,7	1	22		2	11	9	
Fauvette grisette	<i>Curruca communis</i>	LC	LC	LC	LC	C	9,2	5	63		20	21	20	2
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	LC	NT	LC	LC	PC	0,2	5	1				1	
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	-	LC	LC	LC	C	1,3	1	8	2	3	2	1	
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	LC	LC	LC	LC	C	6,5	4	44	20	9	8	4	3
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	LC	LC	NT	LC	C	2,2	5	14		1	4	2	7
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	-	LC	NT	VU	PC	8,5	21	61	11	15	9	22	4

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LRM	LRE	LRN	LRR	R	F	Nb max	NB	3	4	5	6	7
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	LC	LC	LC	EN	R	0,3	8	3				3	
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	LC	LC	LC	LC	AR	1	3	6		2	1	3	
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	LC	LC	-	LC	R	0,2	5	1				1	
Grande Aigrette	<i>Ardea alba</i>	LC	LC	NT	EN	TR	0,7	10	4	1	2		1	
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,2	12	1			1		
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	LC	LC	LC	LC	C	13,4	2	86	12	19	31	11	13
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	LC	LC	LC	LC	C	5,2	4	32	10	10	10	1	1
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	LC	LC	LC	NA	TR	0,2	8	1	1				
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	NT	LC	-	-	-	0,2	1	1	1				
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	LC	LC	LC	LC	TC	27,7	3	177	38	49	50	37	3
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	LC	LC	LC	LC	PC	0,8	2	5	1		1	3	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	LC	LC	LC	LC	R	0,7	10	4	1	1		2	
Héron garde-boeufs	<i>Bulbucus ibis</i>	LC	LC	LC	LC	-	1	19	6	2	1	2	1	
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	LC	LC	NT	LC	C	3,5	20	21		2	6	12	1
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	LC	LC	LC	LC	PC	0,2	10	1		1			
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	LC	LC	NT	LC	TC	13,2	20	83		17	24	30	12
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	LC	LC	LC	VU	R	0,5	4	3		1	1		1
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	LC	LC	LC	LC	C	3,8	2	23		1	12	8	2
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	LC	LC	VU	LC	TC	13,2	21	90	10	30	18	22	10
Locustelle lusciniôïde	<i>Locustella luscinioides</i>	LC	LC	EN	VU	TR	0,2	3	1				1	
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	LC	LC	NT	LC	PC	0,2	1	1		1			
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	LC	LC	LC	LC	PC	1,3	1	8		2	6		
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	LC	NT	NT	LC	C	2,7	35	18		1	4	8	5
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	LC	LC	LC	LC	TC	63,9	8	484	73	125	158	100	28
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	LC	LC	LC	LC	C	2,3	10	14	2	5	4	1	2
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	LC	LC	LC	LC	TC	29	8	181	40	49	39	37	16
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	LC	LC	LC	LC	TC	31,1	6	202	49	72	52	19	10

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LRM	LRE	LRN	LRR	R	F	Nb max	NB	3	4	5	6	7
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	LC	LC	LC	LC	C	0,5	2	3	2		1		
Mésange noire	<i>Periparus ater</i>	LC	LC	LC	NT	PC	0,3	1	2			1		1
Mésange nonnette	<i>Poecile palustris</i>	LC	LC	LC	VU	C	2,3	2	14	4	7	1		2
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	LC	LC	LC	LC	TC	25,4	21	187	41	38	48	40	20
Mouette rieuse	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	LC	LC	NT	EN	R	1	20	6	1		2	2	1
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	LC	LC	VU	NA	TR	0,2	1	1				1	
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	LC	LC	LC	LC	PC	0,3	5	2		1		1	
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	LC	LC	LC	LC	C	12,2	2	76	22	18	16	16	4
Pic épeichette	<i>Dryobates minor</i>	LC	LC	VU	VU	PC	0,3	1	2		1			1
Pic mar	<i>Dendrocoptes medius</i>	LC	LC	LC	LC	PC	1,5	1	9	3			4	2
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,7	2	4	1	2		1	
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	LC	LC	LC	LC	C	14	4	87	30	23	10	12	12
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	LC	LC	LC	LC	C	16,4	7	106	38	20	19	26	3
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	LC	LC	NT	VU	R	0,3	5	2				2	
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia f. domesticus</i>	LC	LC	DD	-	TC	4	12	34	7	12	2	9	4
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	LC	LC	LC	LC	PC	1,3	2	10		1	5		4
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	LC	LC	LC	LC	TC	63,1	19	490	81	115	116	117	61
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	LC	LC	LC	LC	TC	59,1	10	444	91	111	118	101	23
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	LC	LC	LC	VU	C	1,8	1	11		4	4	3	
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	NT	NT	VU	VU	PC	1,7	6	12	1	7	2	2	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	LC	LC	NT	VU	PC	1,3	1	8		6	2		
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	LC	LC	NT	VU	PC	1,2	1	7		2	4	1	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	LC	LC	LC	LC	TC	53,9	8	363	81	110	87	75	10
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	LC	LC	NT	LC	C	5	2	31	10	10	5	3	3
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	LC	LC	NT	LC	C	1,3	1	8	1	2	3	2	
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	LC	LC	LC	VU	AR	0,8	2	6		3	3		
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	LC	LC	LC	LC	TC	40,4	3	279	74	78	71	42	14

Nom vernaculaire	Nom scientifique	LRM	LRE	LRN	LRR	R	F	Nb max	NB	3	4	5	6	7
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	LC	LC	LC	LC	PC	2	1	12		5	6	1	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	LC	LC	LC	LC	C	4,8	2	31	4	9	9	7	2
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,2	5	1				1	
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,3	3	4			3	1	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	LC	LC	VU	VU	PC	0,8	1	5	1	3		1	
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	LC	LC	LC	NT	C	7,7	3	50	22	10	7	5	6
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	LC	LC	LC	VU	TR	0,2	1	1			1		
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	LC	LC	LC	LC	AR	0,2	3	1		1			
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	LC	LC	VU	EN	R	0,2	3	1				1	
Tarier pâtre	<i>Saxicola rubicola</i>	LC	LC	NT	LC	C	2,3	3	14	2	4	6	2	
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	LC	LC	NT	CR	TR	0,2	1	1	1				
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	VU	VU	VU	VU	C	1,8	1	11			4	7	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	LC	LC	LC	LC	TC	24,2	5	175	33	49	37	40	16
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	LC	LC	NT	CR	-	0,2	2	1			1		
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	LC	LC	LC	LC	TC	49,1	4	349	76	113	91	57	12
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	NT	VU	NT	NT	AR	0,3	4	2				1	1
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>	LC	LC	VU	LC	TC	10,7	8	68	27	11	15	11	4